

Information om behandling av ADHD med Elvanse[®] (lisdexamfetamin)

❖ Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.
Subventioneras endast när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt.

Patientinformation
– till personer som fått
Elvanse förskrivet

Denna broschyr vänder sig till dig som har ett barn som har ordinerats Elvanse. Elvanse är ett läkemedel för behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet.



Vad är ADHD?

ADHD betraktas numera som ett neuropsykiatriskt tillstånd med både biologiska och psykologiska orsaker. Orsakerna är inte fullständigt kända, men det har konstaterats att signalsubstanserna dopamin och noradrenalin är inblandade. En förmodad brist eller obalans av dessa signalämnen kan leda till att hjärnan arbetar lite annorlunda. Detta kan leda till svårigheter att styra beteende, som till exempel att vara uppmärksam och att sitta still. Barn kan också bli intensivare, påhittigare och snabbare, vilket andra gånger kan vara en tillgång för deras utveckling. Läkemedel som höjer nivån av dessa signalsubstanser har visats ha en positiv effekt för personer med ADHD. Även om ADHD i allmänhet förknippas med barndomen så kan symtomen fortsätta upp i vuxen ålder.

Fakta till denna patientbroschyr är hämtade från: Kort om ADHD hos barn och vuxna – en sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt. Artikelnr 2004-110-7. ISBN 91-7201-854-2. Elvanse produktresumé. www.fass.se

Denna broschyr är faktagranskad av Marcus Westin,
Specialist i barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala

Korta fakta om ADHD

- ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder som på svenska betyder uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet.
- ADHD är ett tillstånd som påverkar delar av hjärnan som reglerar uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet.
- Kärnsymtomen vid ADHD är uppmärksamhetsproblem, hyperaktivitet och impulsivitet.
- För att få diagnosen ADHD krävs alltid en noggrann utredning av specialist.
- En ADHD-diagnos kräver en tydlig och varaktig funktionsnedsättning.
- ADHD innebär att barn ibland inte reagerar och svarar på information på samma sätt som andra barn. De kan också ha problem med gruppaktiviteter och relationer.
- ADHD är ett relativt vanligt tillstånd. Mellan ca 3–5 procent av alla barn i skolåldern är drabbade.
- ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Detta är ett erkännande av att barnets beteende inte alltid är viljestyrt.

Därför läkemedelsbehandling

I Sverige har ca 3–5 procent av barn i skolåldern ADHD. Många av dessa barn har stora problem både hemma och i skolan trots anpassningar och särskilt stöd. Barnen kan därför ha nytta av behandling med ADHD-läkemedel. Majoriteten av barn med ADHD som behandlats med dessa läkemedel visar en tydlig förbättring i sina symtom.

Målet med behandling är först och främst att förbättra uppmärksamhet, öka koncentrationsförmågan samt minska motorisk oro och ofrivillig impulsivitet. Läkemedelsbehandling kan bidra till förbättrad koncentration. Därigenom kan barnets sätt att fungera förbättras. Samvaron med andra underlättas och misslyckandena i vardagen blir färre. Barnet har också lättare att klara skolan. Dessutom tycks läkemedel förbättra kognitiva funktioner som att tänka ut lösningar på problem. De kan också förbättra finmotoriken och minska humörsvängningar. De positiva behandlingseffekterna gör att barn och ungdomar med ADHD under kritiska år av sin uppväxt får lättare att tillgodogöra sig hjälp och stöd från omgivningen och klara sin inläring bättre.

Ditt barn har ordinerats Elvanse

Här får du information om Elvanse. Innan ditt barn påbörjar en behandling ska du ta del av bipacksedeln.

Varför Elvanse?

Elvanse används för att behandla ADHD och innehåller det verksamma ämnet lisdexamfetamindimesylat som antas höja halten av signalsubstanserna dopamin och noradrenalin. Det kan förbättra uppmärksamhet och koncentration och kan också göra barnet mindre impulsivt och överaktivt. Elvanse är en långverkande medicin som verkar från morgon till kväll.

Innan behandlingen påbörjas

Innan behandlingen med Elvanse påbörjas kommer läkaren att undersöka ditt barn för att få reda på om han/hon passar för behandlingen och kommer att få nytta av den. Det är viktigt att lämna så många uppgifter som möjligt till läkaren eftersom det underlättar beslutet om Elvanse är rätt behandling för ditt barn. Kanske gör läkaren också fler undersökningar innan barnet börjar ta Elvanse. I bipacksedeln som finns i förpackningen finns viktig information om Elvanse. Ta noga del av denna information.



Hur tar man Elvanse?

Elvanse ska alltid tas precis så som läkaren har informerat om. Om du är osäker ska du kontakta barnets läkare eller apoteket. Elvanse ska tas på morgonen, med eller utan mat.

Elvanse kan tas på tre sätt:

Kapseln kan sväljas hel tillsammans med vatten eller så öppnas kapseln och innehållet hälls ut i ett glas vatten. Rör runt med en sked och låt barnet dricka vattnet med detsamma. Vattnet får inte sparas till senare. Det kan finnas en tunn beläggning i glaset när vattnet har druckits ur. Detta är inte det verksamma ämnet. Dosen i en kapsel får inte delas, hela kapselns innehåll ska intas.



Metod 1

Elvanse-kapseln kan sväljas hel.



Metod 2

Elvanse-kapseln kan öppnas och innehållet lösas upp i vatten eller juice och drickas.



Metod 3

Elvanse-kapseln kan öppnas och innehållet blandas i mjuk mat, t.ex. yoghurt.

Om barnet glömmer att ta Elvanse ska han/hon vänta till nästa dag. Man får inte ta dubbel dos för att kompensera. Elvanse ska inte tas på eftermiddagen, eftersom det kan göra det svårare att somna på kvällen.


Om man slutar att ta Elvanse kan ADHD-symtomen komma tillbaka. Ditt barn bör inte sluta ta Elvanse utan att ni först har talat med barnets läkare.

Elvanse är bara till *ditt* barn. Du får inte ge Elvanse till någon annan. Det kan skada dem – även om deras symtom liknar ditt barns.

❖ Elvanse är ett beroendeframkallande medel. Iakttag försiktighet och var noga med att följa behandlande läkares anvisningar.

Doser

Elvanse finns i sex olika dosalternativ. Den rekommenderade startdosen är 30 mg. Läkaren kommer sedan att individuellt anpassa dosen till ditt barn.



Möjliga biverkningar

Biverkningar är oönskade effekter av ett läkemedel. Precis som andra läkemedel kan Elvanse ge biverkningar, men det är inte alla som upplever dem. Läkaren kommer att berätta om dessa biverkningar. De vanligaste biverkningarna (de som påverkar fler än 1 av 10 personer) är nedsatt aptit, viktninskning, insomni, muntorrhet, huvudvärk eller smärta i övre delen av buken. Elvanse kan orsaka viktninskning hos vissa barn och ungdomar. Ditt barns läkare kommer därför noga att följa barnets längd och vikt och hur mycket han/hon äter. Om barnet inte växer som förväntat kommer läkaren eventuellt att avbryta behandlingen med Elvanse.

Man kan också uppleva andra slags biverkningar. Om ditt barn upplever biverkningar av något slag ska du kontakta barnets läkare.

Märker ni någon oväntad förändring är det viktigt att ta kontakt med er läkare.

Det finns en mer detaljerad lista över möjliga biverkningar i bipacksedeln i förpackningen. Ta noga del av denna information.

När barnet tar Elvanse

Det är viktigt med en regelbunden kontakt med barnets läkare så att han/hon kan se till att Elvanse verkar och att ditt barn växer och utvecklas som det ska. Om ditt barn har tagit Elvanse i över ett år kan läkaren välja att avbryta behandlingen för att se om han/hon fortfarande har behov av Elvanse. Om du har en dotter som är eller planerar att bli gravid så ska ni prata med hennes läkare.

Viktigt att komma ihåg

- **Förvara Elvanse säkert** – Elvanse är bara till *ditt* barn. Du får INTE låta andra få tag på den. Elvanse hjälper ditt barn, men kan eventuellt skada andra.
- **Om ditt barn glömmer att ta Elvanse** – Vänta till nästa dag och ta bara en kapsel då. Det är viktigt att ditt barn inte tar för mycket läkemedel för det kan göra honom/henne sjuk.
- **Om barnet inte blir bättre efter en månads behandling** – Tänk på att det kan ta några veckor innan en förbättring noteras. Följ de råd och rekommendationer som ni fått av er läkare.
- **Mer information** – En mer detaljerad information om Elvanse finns i bipacksedeln i förpackningen.

Om du har frågor till läkaren eller sjuksköterskan kan du skriva dem här.

För mer information om ADHD besök gärna:

attention-riks.se – Riksförbundet Attention, intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD.



❖ Beroendeframkallande medel.

Iakttta största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Rx, särskild receptblankett krävs. (F) Subventioneras endast när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt.

Elvanse 20/30/40/50/60/70 mg (lisdexamfetamindimesylat) hårda kapslar. ATC-kod N06BA12, centralt verkande sympatomimetika. **Indikation:** Elvanse är indicerat som en del i ett omfattande behandlingsprogram anpassat för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet) hos barn i åldern 6 år och äldre, när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt. Behandling med Elvanse är inte indicerat för alla barn med ADHD och beslutet att använda läkemedlet måste grundas på en mycket noggrann bedömning av svårighetsgrad och kronicitet av barnets symtom i förhållande till barnets ålder och risk för missbruk, felanvändning eller avvikande användning. Behandlingen ska ske under överinseende av specialist på beteendestörningar hos barn och/eller ungdomar.

Kontraindikationer: överkänslighet mot sympatomimetiska aminer eller mot något hjälpämne, samtidig användning av monoaminoxidas (MAO)-hämmare eller inom 14 dagar efter att dessa läkemedel har satts ut på grund av risk för hypertensiv kris, hypertyroidism eller tyreotoxikos, agitationstillstånd, symtomatisk kardiovaskulär sjukdom, avancerad arterioskleros, måttlig till svår hypertoni samt glaukom. **Varningar och försiktighet:** missbruk och beroende, kardiovaskulära biverkningar, psykiska biverkningar, tics, långsiktig tillväxthämning (längd och vikt), kramper, synstörningar, förskrivning och utlämning samt användning tillsammans med andra sympatomimetiska läkemedel. **Biverkningar:** De biverkningar som observerats i samband med behandling med Elvanse motsvarar de som ofta förknippas med användning av stimulantia.

Mycket vanliga biverkningar: nedsatt aptit, insomni, huvudvärk, smärta i övre delen av buken och viktnedgång.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Kan ha en måttlig effekt. Datum för senaste översyn av SPC: 11/2019. Vid förskrivning och för mer information om varningar och försiktighet, graviditet och amning, biverkningar, förpackningar och aktuella priser, se www.fass.se.