



Information om behandling av
ADHD med Intuniv® (guanfacin)

PATIENTINFORMATION – Till dig som har ett barn eller ungdom som ordinerats Intuniv®

Denna broschyr har du fått av läkaren.

intuniv®
(guanfacin)
Depottablett 1•2•3•4 mg

Denna broschyr vänder sig till dig som har ett barn eller ungdom som ordinerats INTUNIV.

INTUNIV är ett läkemedel för behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet hos barn och ungdomar i åldern 6-17 år för vilka stimulantia inte är lämpliga, inte tolereras eller har visats vara ineffektiva. Läkemedlet ges som en del i ett behandlingsprogram som vanligtvis består av psykologiska, pedagogiska och sociala åtgärder.

Läs även noggrant igenom informationen i bipacksedeln som ligger i INTUNIV-förpackningen.



Vad är ADHD?

ADHD betraktas som ett neuropsykiatriskt tillstånd med både biologiska och psykologiska orsaker. Orsakerna är inte fullständigt kända, men det har konstaterats att signalsubstanserna dopamin och noradrenalin är inblandade. En teori är att brist på eller obalans av dessa signalämnen kan leda till att hjärnan arbetar lite annorlunda. Detta kan leda till svårigheter med vissa beteenden, som till exempel att vara uppmärksam och att sitta still. Barn kan också bli intensivare, påhittigare och snabbare, vilket andra gånger kan vara en tillgång för deras utveckling. Läkemedel som höjer nivån av dessa signalsubstanser har visats ha en positiv effekt för personer med ADHD.

Även om ADHD i allmänhet förknippas med barndomen så kan symtomen fortsätta upp i vuxen ålder.



Fakta till denna patientbroschyr är hämtade från:

- 1. Kort om ADHD hos barn och vuxna** – en sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt. Artikelnr 2004-110-7. ISBN 91-7201-854-2.
- 2. INTUNIV bipacksedel och produktresumé.** www.fass.se.

Innehållet är faktagranskat av Marcus Westin, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala.

Korta fakta om ADHD

- ADHD är en förkortning av **Attention Deficit Hyperactivity Disorder** som på svenska betyder uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet.
- ADHD är ett tillstånd som innebär att delar av hjärnan som reglerar **uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet** är påverkade.
- Kärnsymtomen vid ADHD är **uppmärksamhetssvårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet**.
- För att få diagnosen ADHD krävs alltid en **noggrann utredning** av specialist.
- En ADHD-diagnos kräver en tydlig och **varaktig funktionsnedsättning**.
- ADHD är **inte ett sällsynt tillstånd**. Mellan ca 3–5 procent av alla barn i skolåldern är drabbade.
- ADHD är en **neuropsykiatrisk funktionsnedsättning**. Detta är ett erkännande av att barnets beteende inte alltid är viljestyrt.

Varför läkemedelsbehandling?

I Sverige har cirka 3–5 procent av barn i skolåldern ADHD. Många av dessa barn har stora problem både hemma och i skolan trots anpassningar och särskilt stöd. Barnen kan därför ha nytta av behandling med ADHD-läkemedel.

Målet med behandling är först och främst att förbättra uppmärksamhet, öka koncentrationsförmågan samt minska motorisk oro och ofrivillig impulsivitet. Intuniv kan hjälpa till att förbättra koncentrationsförmågan och minska hyperaktivitet och impulsivitet. Därigenom förbättras barnets funktion (sätt att fungera).



Ditt barn har ordinerats INTUNIV

Denna skrift informerar om vad INTUNIV är, hur man tar det och hur det kan hjälpa till att kontrollera ADHD-symtom. Innan ditt barn påbörjar sin behandling bör du läsa igenom bipacksedeln som finns i INTUNIV-förpackningen.

Vad är INTUNIV och hur fungerar det?

INTUNIV är ett icke-centralstimulerande läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ungdomar mellan 6 och 17 år. INTUNIV ges som en del i ett behandlingsprogram som vanligtvis består av psykologisk behandling (psykoterapi), utbildning och stödinsatser.

Hos människor med ADHD är vissa delar av hjärnan påverkade. De delar som hjälper personen att vara uppmärksam, minnas detaljer och planera sin vardag kan påverkas i olika utsträckning. ADHD påverkar också hur man fungerar socialt.

INTUNIV kan hjälpa till att förbättra uppmärksamhet och koncentration, och göra barnet mindre impulsivt och hyperaktivt.

INTUNIV är inte klassat som ett beroendeframkallande läkemedel.



Hur påverkar INTUNIV ditt barn?

INTUNIV är ett långtidsverkande läkemedel som tas en gång per dygn, antingen morgon eller kväll.

INTUNIV kan hjälpa till att underlätta i vardagen. Det vill säga allt från morgonens påklädning och dagens koncentrationskrävande skolarbete, till fritidens och kvällens umgänge med kompisar och familj.

Hur tar man INTUNIV?

INTUNIV ska alltid tas enligt läkarens anvisningar.

Vid osäkerhet, kontakta barnets läkare eller apoteket.

INTUNIV finns i fyra olika styrkor (1, 2, 3 och 4 mg). Den rekommenderade startdosen av INTUNIV är 1 mg. Barnets läkare kan sedan öka dosen för att hitta rätt dos för just ditt barn. Den dagliga dosen kommer att ligga mellan 1–7 mg.

Försäkra dig om att ditt barn tar INTUNIV vid samma tidpunkt varje dag, antingen på morgonen eller kvällen. Låt inte barnet sluta ta sin medicin utan att först tala med barnets läkare.

1 mg



2 mg



3 mg



4 mg



- INTUNIV tas en gång per dygn.
- INTUNIV kan tas med eller utan mat. Om det tas samtidigt med måltid: undvik mat med högt fetthinnehåll.
- Svälj tabletten hel med ett glas vatten eller annan dryck (ej grapefruktjuice).
- Bryt, krossa eller tugga inte tabletten då det påverkar läkemedlets verkan.

Om barnet glömmer att ta INTUNIV ska ni vänta till nästa dag med att ta den vanliga dosen. Man ska aldrig ta dubbel dos för att kompensera. Om barnet har glömt att ta sin medicin två eller flera dagar, prata med er läkare. Om ditt barn har tagit för stor mängd av INTUNIV ska du omedelbart tala med en läkare eller uppsöka ett sjukhus. Ta med dig läkemedelsförpackningen och tala om hur mycket ditt barn har tagit.



Detta kan ni förvänta er

Innan ditt barn börjar behandling med Intuniv kommer er läkare att undersöka ditt barn för att få reda på om han/hon passar för behandlingen och kommer att få nytta av den. Ditt barn kommer bli kallad till kontinuerliga kontroller under behandling och något oftare vid justering av dos. Var tålmodig. Ni kanske inte märker någon omedelbar effekt när behandlingen påbörjas. Vissa patienter kan märka en förbättring efter den första veckan, men det kan ta längre tid. Som regel ordinerar läkaren först lägsta dosen INTUNIV för att under följande veckor stegvis finjustera dosen upp till rätt nivå. Symtomkontroll av ADHD sker först när ditt barn har nått rätt dos.

Hur lång tid det tar tills man ser en förbättring varierar beroende på barnets vikt och hur snabbt kroppen svarar på behandlingen. Att notera hur ditt barn mår och vara uppmärksam på eventuella biverkningar kan hjälpa barnets läkare att hitta rätt dosering.

Möjliga biverkningar

Biverkningar är oönskade effekter av ett läkemedel. Precis som andra läkemedel kan INTUNIV ge biverkningar, men det är inte alla som upplever dem. Läkaren kommer att berätta mer om dessa biverkningar.

De vanligaste biverkningarna (de som påverkar fler än 1 av 10 personer) är sömnhet (somnolens), trötthet, huvudvärk och magsmärta. Man kan också uppleva andra slags biverkningar. Om ditt barn upplever biverkningar av något slag ska du kontakta barnets läkare.

Viktigt att komma ihåg

- Tala om för barnets läkare om ditt barn tar något annat läkemedel.
- Tabletten ska sväljas hel och får ej brytas, krossas eller tuggas.
- Var noggrann med att ditt barn får i sig tillräckligt med vätska, dock ej grapefruktjuice.
- Låt inte ditt barn ta INTUNIV tillsammans med mat med högt fettinnehåll.
- Låt inte ditt barn på eget bevåg avbryta sin medicinering.
- Man kan känna sig yr och dåsig när man tar INTUNIV, särskilt i början av behandlingen. Om ditt barn upplever biverkningar av något slag ska du kontakta barnets läkare.
- Patienterna ska inte dricka alkohol när de behandlas med Intuniv.
- Det finns begränsad studiedata från användning av guanfacin vid graviditet. Intuniv rekommenderas inte under graviditet.

Mer detaljerad information om INTUNIV finner du i förpackningens bipacksedel eller på [fass.se](https://www.fass.se).



Märker ni någon oväntad förändring är det viktigt att ta kontakt med er läkare. Det finns en mer detaljerad lista över möjliga biverkningar i bipacksedeln i förpackningen. Ta noga del av denna information.

Anteckningar

Om du har frågor till läkaren eller sjuksköterskan kan du skriva dem här:





INTUNIV subventioneras endast när svar på tidigare behandling med centralstimulerande medel och atomoxetin bedöms vara kliniskt otillräckligt, eller när behandling med dessa är olämpligt.



Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till: Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se.

INTUNIV® (guanfacin) 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg depottabletter. Receptbelagt läkemedel. Detta läkemedel används för att behandla ADHD hos barn och ungdomar i åldern 6 till 17 år för vilka nuvarande stimulerande läkemedel inte är lämpligt och/eller nuvarande läkemedel inte ger tillräcklig kontroll av ADHD-symtomen. INTUNIV används som en del i ett omfattande ADHD-behandlingsprogram, som normalt omfattar psykologiska, pedagogiska och sociala åtgärder. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre och känner dig mycket sömrig eller dåsig efter att ha tagit detta läkemedel i cirka 6 veckor. Om du blir sömrig eller dåsig ska du inte framföra fordon eller använda maskiner. Sluta inte att ta Intuniv utan att prata med läkare. Om du plötsligt slutar att ta Intuniv kan du få utsättningssymtom i form av ökad hjärtfrekvens och högt blodtryck. Läs noga igenom bipacksedeln innan läkemedlet börjar användas. INTUNIV ska alltid tas enligt läkarens anvisningar. Förkortad information baserad på bipacksedel daterad **06/2020**. **För fullständig information** om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering samt pris, se fass.se. Takeda Pharma AB, www.takeda.se.



Takeda Pharma AB | + 46 8 731 28 00 | www.takeda.se